



Автономная некоммерческая организация
«Владимирский региональный Учебный центр безопасности
труда»

600032, г.Владимир, ул. Добросельская, д. 217, офис 219
Тел. 8(4922) 40-04-40, e-mail: vladrucbt@yandex.ru
ИНН/КПП 3328999043/332901001, ОГРН 1113300000483,
р/с40703810100000000489 в АО «Владбизнесбанк»
г.Владимир, к/с 30101810100000000706, БИК 041708706

Тестовые вопросы для проверки знаний по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи

(теоретическая часть обучения)

БИЛЕТ 1

1. По каким признакам диагностируется состояние биологической смерти, при котором реанимационные действия уже не проводятся?

- Отсутствует пульс на сонной артерии, отсутствует сознание, зрачки не реагируют на свет
- Зрачок не возвращается в исходное положение при сдавливании глазного яблока, есть трупные пятна, роговица глаза высохшая
- Отсутствует пульс на сонной артерии, сознания нет несколько минут, зрачки не реагируют на свет

2. Порядок действий при термическом ожоге с поврежденными ожоговыми пузырями:

- охладить место ожога (струя холодной воды в течение 10-15 мин/приложить холод на 20-30 мин)
- накрыть повреждение сухой чистой тканью, охладить поверхность ткани
- очистить место ожога от загрязнения, обработать жиросодержащим веществом, накрыть повреждение сухой чистой тканью

3. Порядок действий при отравлении дымом, если пострадавший находится в сознании:

- обеспечить доступ свежего воздуха, уложить горизонтально, дать вовнутрь лекарство с сорбирующими свойствами
- вывести из зоны задымления, дать крепкий сладкий чай
- вывести из зоны задымления, усадить или уложить пострадавшего, облегчить дыхание (расстегнуть сдавливающую одежду), напоить теплым чаем

БИЛЕТ 2

1. Порядок действий при термическом ожоге с целыми ожоговыми пузырями:

- охладить место ожога (струя холодной воды в течение 10-15 мин/приложить холод на 20-30 мин), не вскрывая ожоговый пузырь и не удаляя загрязнения
- вскрыть ожоговый пузырь, очистить место ожога от загрязнения, приложить холод
- не вскрывая ожоговый пузырь, очистить место ожога от загрязнения, обработать жиросодержащим веществом

2. По каким признакам диагностируется состояние клинической смерти, требующее безотлагательных реанимационных действий?

- Отсутствует пульс на сонной артерии, отсутствует сознание, зрачки не реагируют на свет
- Зрачок не возвращается в исходное положение при сдавливании глазного яблока, есть трупные пятна, роговица глаза высохшая
- Отсутствует пульс на сонной артерии, сознания нет несколько минут, зрачки не реагируют на свет

3. Что следует делать при обморожении?

- Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять обувь и одежду, растереть место обморожения спиртовым раствором, смазать жиром
- Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять обувь и одежду, обеспечить сухое согревание (одеяло) и обильное теплое питье
- Растереть снегом, доставить пострадавшего в теплое помещение, снять обувь и одежду, согреть в ванне с теплой водой

БИЛЕТ 3

1. Порядок действий при переохлаждении:

- растереть снегом, доставить в теплое помещение, дать теплое питье, снять обувь и одежду, согреть в ванной с теплой водой
- доставить в теплое помещение, дать теплое обильное питье, не снимая одежды и обуви обеспечить сухое согревание (одеяло)
- доставить в теплое помещение, снять обувь и одежду, растереть спиртосодержащим веществом, обеспечить сухое согревание (одеяло)

2. Что прикладывается к месту растяжения или ушиба:

- холод
- тепло
- спиртовой компресс

3. При признаках клинической смерти необходимо:

- Сделать 15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания, приподнять ноги пострадавшего и вызвать скорую помощь
- Сделать 15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь
- Сделать 15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, вызвать скорую помощь, реанимацию не прекращать до прибытия медицинского персонала

БИЛЕТ 4

1. Порядок действий при отравлении дымом, если пострадавший находится без сознания:

- вынести из зоны задымления, облегчить дыхание (разорвать или расстегнуть одежду), проверить наличие пульса, провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после появления дыхания положить на бок, укрыть, напоить теплым сладким чаем
- вынести из зоны задымления, облегчить дыхание (разорвать или расстегнуть одежду), после появления дыхания положить набок, укрыть
- вынести из зоны задымления, облегчить дыхание (разорвать или расстегнуть одежду), дать понюхать нашатырный спирт и напоить крепким сладким чаем, дать лекарство с сорбирующими свойствами

2. Что не входит в комплекс мер по оказанию первой помощи утопающему?

- Уложить пострадавшего на колени спасателя лицом вниз и вызвать механическим путем рвоту (надавить на корень языка)
- Уложить на бок, дать согревающее питье
- Перевернуть на спину, освободить ротовую полость от рвотных масс, тины, приступить к непрямому массажу сердца и искусственному дыханию

3. Что нельзя делать при оказании первой помощи при переломах?

- Останавливать кровотечение
- Фиксировать поврежденную конечность
- Вправлять на место кости

БИЛЕТ 5

1. При каком кровотечении наложение жгута нецелесообразно?

- При венозном
- При артериальном
- При капиллярном

2. На какое максимальное время можно оставлять жгут, наложенный на конечность при кровотечении?

- Не более чем на 1 час в любое время года
- До 3 часов независимо от температуры окружающей среды
- Летом - не более чем на 2 часа, зимой - не более чем на 1 час

3. Когда можно прекращать реанимационные действия по оказанию первой помощи утопающему?

- Признаки дыхательной недостаточности полностью исчезли
- Есть незначительное нарушение ритма дыхания
- Дыхание есть, но оно учащенное

БИЛЕТ 6

1. Порядок действий при оказании первой помощи при открытом переломе:

- остановить кровотечение, дать обезболивающее средство, закрыть рану стерильной повязкой, наложить транспортную шину
- вправить кость, наложить повязку, дать обезболивающее средство и наложить транспортную шину
- дать обезболивающее средство, наложить транспортную шину

2. Как остановить артериальное кровотечение конечностей?

- Приподнять конечность, наложить тугую повязку на место кровотечения
- Приподнять конечность и зафиксировать в таком положении
- Приподнять конечность, наложить жгут (закрутку из подручных средств) выше раны

3. Как быстро остановить кровотечение из сонной артерии?

- Наложить жгут
- Закрыть рану сдавливающей повязкой
- Артерию зажать пальцем

БИЛЕТ 7

1. Как приостановить кровотечение на конечности при невозможности наложения жгута?

- Обезболивающие таблетки
- Фиксация конечности в максимально согнутом состоянии
- Теплый компресс

2. Какие из признаков определяют открытый перелом конечностей?

- Боль, есть открытая рана, видны кости
- Боль, просматривается деформация конечности
- Боль, есть открытая рана, пострадавший жалуется на ограниченность движения конечностью

3. Для иммобилизации конечности при переломе костей предплечья или голени шина должна захватывать:

- три сустава
- сустав выше места перелома
- суставы выше и ниже места перелома

БИЛЕТ 8

1. Где у пострадавшего проверяется пульс, если человек находится в бессознательном состоянии?

- На запястье
- На грудной клетке
- На сонной артерии

2. Показанием к транспортировке пострадавшего в положении сидя (полусидя) является:

- частая рвота
- проникающее ранение в брюшную полость
- проникающие ранения грудной клетки, шеи

3. Что следует делать при обморожении?

- Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять обувь и одежду, растереть место обморожения спиртовым раствором, смазать жиром
- Доставить пострадавшего в теплое помещение, снять обувь и одежду, обеспечить сухое согревание (одеяло) и обильное теплое питье
- Растереть снегом, доставить пострадавшего в теплое помещение, снять обувь и одежду, согреть в ванне с теплой водой

БИЛЕТ 9

1. Пострадавшего в состоянии комы транспортируют в положении:

- лежа на животе
- лежа на спине
- полусидя или полулежа

2. Признаками верного наложения жгута на конечность являются:

- бледность конечности и снижение температуры кожи
- отсутствие пульса на артериях ниже места наложения жгута
- отсутствие пульса на артериях выше места наложения жгута

3. Пострадавший переносится на щите с валиком под коленями в случае:

- травмы черепа
- подозрениях на повреждение позвоночника и спинного мозга
- подозрениях на повреждение тазобедренного сустава

БИЛЕТ 10

1. Выберите 2 главных признака комы:

- сильный боли в области сердца
- сильная головная боль
- отсутствие сознания
- бледность кожных покровов
- учащенное сердцебиение
- отсутствие пульса на сонной артерии

2. Что нельзя делать при оказании первой помощи при переломах?

- Останавливать кровотечение
- Фиксировать поврежденную конечность
- Вправлять на место кости

3. Как оказывается первая медицинская помощь при вывихе конечностей?

- Вправить конечность, иммобилизовать конечность, приложить холод, дать обезболивающее
- Иммобилизовать конечность, приложить холод, дать обезболивающее
- Иммобилизовать конечность, приложить горячий компресс, дать обезболивающее